

# Cyclone

Fongicide

## BULLETIN DE RECHERCHE

## Essai contre le Blanc sur les fleurs coupées en serre

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- **Ingrédients actifs:** Acide citrique et lactique (produits de fermentation de *Lactobacillus casei* souche LPT-111)
- **Formulation:** Liquide concentré
- **Groupe chimique:** S/O Biopesticide
- **Délai avant la récolte:** 0 jour
- **Délais de réentrée:** Lorsque le produit est sec
- **Approuvé pour l'agriculture biologique**



### MODE D'UTILISATION ÉVALUÉ

CULTURE	MALADIE	TAUX D'APPLICATION	VOLUME DE PULVÉRISATION	INTERVALLE D'APPLICATION
Roses de serre	Blanc	12 L/ha	800 L/ha	Préventif 8 traitements Intervalle de 6 à 8 jours entre les traitements
Gerbera de serre	Blanc	12 à 20 L/ha	1000 L/ha	Préventif 4 traitements Intervalle de 7 jours entre les traitements

### MODE D'ACTION


Cyclone forme une barrière protectrice sur la surface des feuilles qui inhibent le développement des agents pathogènes. Il a également des effets antifongiques sur la germination des conidies, la formation du tube germinatif, la formation et l'élongation de l'appressorium, la ramification des hyphes et la formation de l'haustorium.

## RÉSULTATS

# Cyclone


BULLETIN DE RECHERCHE

### Incidence de l'Oïdium sur les feuilles de rosiers en serre 8 jours après le traitement 5



Essai mené à  
Drumondville  
QC, 2008

### Blanc sur Gerbera Pourcentage moyen de la surface foliaire recouverte par le blanc



Essai mené de mai à juin 2015 dans une serre de recherche à Kwantlen Polytechnic University (KPU), Langley, Colombie Britannique, Canada

Traitements appliqués 4 fois tout les 7 jours, le 29 mai, le 5 juin, le 12 juin et le 19 juin.

NOVA a été appliqué 3 fois à 10 jours d'intervalle, le 29 mai, le 8 juin et le 18 juin.

Pourcentage moyen de la surface foliaire recouverte par le blanc évalué, selon l'échelle visuelle Horsfall-Barrett, de 0 à 11 et ramené en pourcentage. Moyenne de 5 plants par parcelle.

Les moyennes non suivies par une lettre commune sont significativement différentes (P=0.05) tel que déterminé par le test Tukey HDS.

Pour plus d'informations, contactez votre détaillant agricole local

Cyclone est homologué au Canada pour AEF Global inc. Prière de se référer à l'étiquette du produit pour les détails complets concernant l'application. Toujours lire et suivre les informations fournies sur l'étiquette. Aller au [www.aefglobal.com](http://www.aefglobal.com) pour une information complète sur le produit.

Cyclone n'est pas homologué pour la culture du Gerbera.