

# Influence™ LC

Fongicide

## FICHE TECHNIQUE

Tomate

## Outil de lutte contre le Blanc

### CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

- ✓ **Aucun délais** avant récolte, permettant ainsi de conserver le contrôle de la maladie et la qualité de la récolte
- ✓ **Sécuritaire** pour les organismes bénéfiques et les pollinisateurs\*
- ✓ **Peu de risque** de développement de résistance en raison des modes d'action multiples
- ✓ **S'intègre parfaitement** à votre programme de lutte intégrée
- ✓ **Excellente alternative** à utiliser en rotation avec d'autres produits ou pour les mélanges en réservoir
- ✓ **Approuvé** pour l'agriculture biologique



\* Sécuritaire pour les organismes bénéfiques et les pollinisateurs lorsque le produit est utilisé conformément au mode d'emploi de l'étiquette.

### MODE D'UTILISATION

CULTURE	MALADIE	TAUX D'APPLICATION	VOLUME DE PULVÉRISATION	INTERVALLE D'APPLICATION
Tomates de serre	Blanc ( <i>Oidium neolycopersici</i> )	Utiliser une dose de 1,8% avec un pulvérisateur à haut volume (ex hydraulique). Ne pas excéder 18L/ha.	Assurer une couverture complète du feuillage.	Répéter les applications à des intervalles de 7-10 jours pour maintenir une réduction de la maladie.

### MODE D'ACTION

Influence provoque la plasmolyse des conidies et du mycélium du champignon pathogène qui se développe à la surface de la feuille.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- **Ingrédient actif:** Ail
- **Emballage:** Une (1) caisse = 2 x 10L
- **Formulation:** Liquide concentré
- **Groupe chimique:** S/O Biopesticide
- **Délai avant la récolte:** 0 jour
- **Délai de réentrée:** Lorsque le produit est sec

# RECOMMANDATIONS POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX

- Utiliser des buses à jets coniques et une pression élevée (minimum de 120 PSI)
- Utiliser le volume de pulvérisation minimum pour obtenir une couverture complète du feuillage
- Appliquer de façon préventive ou aux premiers signes de la maladie

# Influence™ LC


## FICHE TECHNIQUE

## COMPATIBILITÉ

- Influence est compatible avec:
- Kocide<sup>md</sup> 2000 (Hydroxide de cuivre)
  - Fontelis<sup>MC</sup> (Penthiopyrad)

## RÉSULTATS

### Effets de Influence LC sur le Blanc



Sévérité sur feuillage (%); Variété de tomate: Patio; Volume de pulvérisation: 700 à 1000 L/ha pendant l'essai. Les moyennes non suivies par une lettre commune sont significativement différentes (P=0.05) tel que déterminé par le test du LSD protégé.

Influence LC est homologué au Canada pour AEF Global inc. Prière de se référer à l'étiquette du produit pour les détails complets concernant l'application. Toujours lire et suivre les informations fournies sur l'étiquette. Aller au [www.aefglobal.com](http://www.aefglobal.com) pour une information complète sur le produit.