

Influence™ LC

Fongicide

FICHE TECHNIQUE

Tomate

Outil de lutte contre le Blanc

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

- ✓ **Aucun délais** avant récolte, permettant ainsi de conserver le contrôle de la maladie et la qualité de la récolte
- ✓ **Sécuritaire** pour les organismes bénéfiques et les pollinisateurs¹
- ✓ **Peu de risque** de développement de résistance en raison des modes d'action multiples
- ✓ **S'intègre parfaitement** à votre programme de lutte intégrée
- ✓ **Excellente alternative** à utiliser en rotation avec d'autres produits ou pour les mélanges en réservoir
- ✓ **Approuvé** pour l'agriculture biologique



¹ Sécuritaire pour les organismes bénéfiques et les pollinisateurs lorsque le produit est utilisé conformément au mode d'emploi de l'étiquette.

MODE D'UTILISATION

CULTURE	MALADIE	TAUX D'APPLICATION	VOLUME DE PULVÉRISATION	INTERVALLE D'APPLICATION
Tomates de serre	Blanc (<i>Oïdium neolycopersici</i>)	Utiliser une dose de 1,8% avec un pulvérisateur à haut volume (ex hydraulique). Ne pas excéder 18L/ha.	Assurer une couverture complète du feuillage.	Appliquer aux premiers signes de la maladie . Répéter les applications à des intervalles de 7-10 jours pour maintenir une réduction de la maladie.

MODE D'ACTION

Influence provoque la plasmolyse des conidies et du mycélium du champignon pathogène qui se développe à la surface de la feuille.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- **Ingrédient actif:** Ail
- **Emballage:** Une (1) caisse = 2 x 10L
- **Formulation:** Liquide concentré
- **Groupe chimique:** S/O Biopesticide
- **Délai avant la récolte:** 0 jour
- **Délai de réentrée:** Lorsque le produit est sec

Mise à jour : 24/11/2015

AEF GLOBAL
Biopesticides

RECOMMANDATIONS POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX

- Utiliser des buses à jets coniques et une pression élevée (minimum de 120 PSI)
- Utiliser le volume de pulvérisation minimum pour obtenir une couverture complète du feuillage
- Appliquer de façon préventive ou aux premiers signes de la maladie

Influence™ LC


FICHE TECHNIQUE

COMPATIBILITÉ

- Influence est compatible avec:
- Kocide^{md} 2000 (Hydroxide de cuivre)
 - Fontelis^{MC} (Penthiopyrad)

RÉSULTATS

Effets de Influence LC sur le Blanc



Sévérité sur feuillage (%); Variété de tomate: Patio; Volume de pulvérisation: 700 à 1000 L/ha pendant l'essai. Les moyennes non suivies par une lettre commune sont significativement différentes (P=0.05) tel que déterminé par le test du LSD protégé.

Influence LC est homologué au Canada pour AEF Global inc. Prière de se référer à l'étiquette du produit pour les détails complets concernant l'application. Toujours lire et suivre les informations fournies sur l'étiquette. Aller au www.aefglobal.com pour une information complète sur le produit.