

BREVA

RACUN SERANGGA

IRAC II

PEKATAN AMPAIAN (SC)

Perawis Aktif : *Bacillus thuringiensis* subsp. *Kurstaki*
..... 59.52% w/w
Perawis Lengai 40.48% w/w
(*Bacillus thuringeniensis* subsp. *Kurstaki*
..... 11,400 I.U./mg)

No. Pendaftaran : LRMP. R1/9283

Kandungan Bersih : 10 liter

Tarikh Mengilang : :

Tarikh Luput : :

Didaftarkan Oleh : **B Cube Enviro Sdn. Bhd.** (961967-D)

Unit 805, 8th Floor, Block F

Pusat Dagangan Phileo Damansara I

Jalan 16/11, Off Jalan Damansara

46350 Petaling Jaya

Selangor

Tel. : 603 7932 4170

Fax. : 603 7932 2178

Jika berlaku KERACUNAN,
sila hubungi TALIAN KECEMASAN:



BACA LABEL SEBELUM GUNA

勿將藏在靠近食品或
兒童所接觸的地方

KEEP AWAY FROM
FOODSTUFF AND CHILDREN

KELAS IV

JAUHKAN DARIPADA
MAKANAN DAN KANAK-KANAK

உயிர்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு
ஈதையில் வைக்காதிரி

AWAS:

a) **Bahaya Kepada Manusia:**

Berbahaya jika tertelan. Elakkan daripada terhidu wasap dan kabus semburan. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, **JANGAN** makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Cuci alat penyembur sebersih-bersihnya selepas menggunakan. Pastikan mandi sebersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak.

b) **Pakaian dan Alat Perlindungan:**

Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai kasut getah pakaian pelindung diri (PPE) berpiawaian termasuk sarung tangan, gogal, penutup muka dan alat pernafasan mengikut kesesuaian. (Rujuk risalah data keselamatan)

c) **Bahaya Pada Alam Sekitar:**

Produk ini adalah berbahaya pada organisme akuatik dan ikan. **JANGAN** cemarkan kolam, sungai atau saliran air.

TANDA KERACUNAN:

Tanda Awal: Mual, muntah, cirit-birit, sakit perut, demam, kerengsaan (kemerahan, gatal)

Tanda Tertangguh: Tiada tanda keracunan spesifik. Segara dapatkan rawatan sekiranya mengalami sebarang tanda umum keracunan seperti mual, muntah, sakit perut, air liur berlebihan, sakit tekak, sesak nafas, ketat dada, nafas laju, berdebar-debar, gangguan deria rasa, kemerahan pada bahagian terdedah, sawan, koma atau sebarang masalah kesihatan.

RAWATAN KECEMASAN: Jika terkena pakaian, tanggalkan kesemua pakaian, mandi dengan segera dan ganti pakaian yang bersih. Jika terkena pada kulit, bersihkan dengan sabun dan air yang banyak. Jika terkena pada mata, tanggalkan kanta lekap (jika ada) alirkan air yang banyak pada bahagian mata sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, **JANGAN** ikhtiarkan untuk muntah dan **JANGAN** beri apa-apa melalui mulut. Jika terhidu, pindahkan mangsa ke kawasan pengudaraan yang bersih. Bawa mangsa ke Pusat Perubatan/Klinik/Hospital yang terdekat dengan segera. Dinasihatkan bawa bersama label atau bekas racun perosak.

BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA. JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.

EMPTY PESTICIDE CONTAINER SHOULD BE TRIPLE RINSED BEFORE DISPOSAL. DO NOT USE EMPTY PESTICIDE CONTAINER TO STORE FOODSTUFF.

BREVA ialah sejenis racun serangga yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan bacterium yang bertindak secara keracunan perut.

ATURAN PENGGUNAAN:

Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

TANAMAN 農作物	SERANGGA PEROSAK 害蟲	KADAR RACUN 用藥量		ISI PADU SEMBURAN SEHEKTAR 每公頃噴液量
		10 Liter Air 10公升水	Sehektar 每公頃	
Sawit 油棕	ULAT BUNGKUS (<i>Metisa plana</i>)	25 ml 毫升	1.2 liter 公升	480 liter 公升
	ULAT TANDAN (<i>Tirathaba mundella</i>)	20 ml 毫升	1liter 公升	480 liter 公升

Produk ini adalah sangat berbahaya pada ulat sutera. JANGAN sembur pada pokok mulberi atau berhampiran kawasan pemeliharaan ulat sutera.

Panduan Membancuh:

Disyur menggunakan alat penyembur galas bernozel hollow cone. Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan **BREVA** secukupnya megikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan bancuh. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi dari yang mengesyorkan. Jangan simpan baki banchuan **BREVA** di dalam tangki alat penyembur.

Panduan Menyembur:

Lakukan semburan apabila serangan mencapai tahap ambang tindakan (ATL). Untuk kawalan yang baik, sembur secara menyeluruh ke permukaan atas dan bawah daun. Ulangi semburan selang **7-14 hari** sekali, apabila perlu sahaja. Jangan guna racun ini melebihi **2 kali semusim**. Jika rawatan perlu diulangi, gunakan **BREVA** berselang-seli dengan racun serangga daripada kumpulan berlainan yang mempunyai cara tindakan berbeza.

Tempoh Dilarang Masuk Semula Kawasan Rawatan (REI): 4 jam

BREVA

RACUN SERANGGA

IRAC II

PEKATAN AMPAIAN (SC)

Perawis Aktif : *Bacillus thuringiensis* subsp. *Kurstaki*

..... 59.52% w/w

Perawis Lengai 40.48% w/w

(*Bacillus thuringeniensis* subsp. *Kurstaki*)

..... 11,400 I.U./mg)

No. Pendaftaran : LRMP. RI/9283

Kandungan Bersih : 10 liter

Tarikh Mengilang :

Tarikh Luput :

Didaftarkan Oleh : **B Cube Enviro Sdn. Bhd.** (961967-D)

Unit 805, 8th Floor, Block F

Pusat Dagangan Phileo Damansara I

Jalan 16/11, Off Jalan Damansara

46350 Petaling Jaya

Selangor

Tel. : 603 7932 4170

Fax. : 603 7932 2178

Jika berlaku KERACUNAN,
sila hubungi TALIAN KECEMASAN:



BACA LABEL SEBELUM GUNA

勿儲藏在靠近食品或
兒童所接觸的地方

KEEP AWAY FROM
FOODSTUFF AND CHILDREN

KELAS IV

JAUHKAN DARIPADA
MAKANAN DAN KANAK-KANAK

உயிர்மன் உற்றும் தீவ்தநைகளுக்கு
ஸ்டீரிங் வைக்குடியில்