2022-2154
2022-06-27

BIOPROTEC FONGICIDE ARBRES FRUITIERS CONCENTRÉ

Fongicide Biologique pour la répression de la tavelure sur le pommier, le pommetier et les poiriers et de l'oïdium (blanc) sur la vigne.

DOMESTIQUE

SOLUTION

GUARANTIE : Poudre d'ail……15 %

NUMÉRO D'HOMOLOGATION 30606… LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

SENSIBILISANT POTENTIEL
ATTENTION – IRRITANT POUR LES YEUX
ATTENTION – IRRITANT POUR LA PEAU

Contenu Net : 200 ml

AEF Global inc.
440, 3e avenue, suite 100
Lévis, Qc, Canada G6W 5M6

(418) 838-4441

Ligne d'assistance sans frais : 1-866-622-3222
www.aefglobal.com

2022-2154
2022-06-27

Bioprotec Fongicide Arbres Fruitiers Concentré est une formulation liquide contenant de poudre d'ail comme ingrédient actif. **Bioprotec Fongicide Arbres Fruitiers Concentré** répresse les agents responsable s de la tavelure sur le pommier, le pommetier et les poiriers et l'oïdium (blanc) sur la vigne (incluant les vignes ornementales). Des applications répétées et une couverture complète du feuillage sont nécessaires pour maintenir une bonne répression de la maladie.

MODE D'EMPLOI :
Éviter d'appliquer ce produit lorsque le vent souffle en rafales.
Utiliser un petit pulvérisateur à dos ou à main pour appliquer **Bioprotec Fongicide Arbres Fruitiers Concentré.** Diluer 7.2 ml (1.5 cuillère à café) **de Bioprotec Fongicide Arbres Fruitiers Concentré** dans 400 ml à 1 L d'eau propre et appliquer sur 4 mètres carrés de feuillage. Le volume de pulvérisation final doit être suffisant pour assurer une couverture complète du feuillage, mais pas au point de causer un ruissellement excessif. Agiter afin de maintenir la suspension. Éviter d'appliquer lorsque des précipitations importantes sont imminentes. Les applications subséquentes peuvent être faites aux 7 à 14 jours si les symptômes persistent

Le délai d'attente avant la récolte (DAR) est 0 (zero) jour.

PRECAUTIONS,

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Peut causer une irritation des yeux. Peut causer une irritation de la peau. Peut causer une sensibilisation de la peau. Peut causer une irritation respiratoire. Éviter d'inhaler la brume de pulvérisation. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants imperméables ainsi que des lunettes de protection pour manipuler, mélanger, charger et appliquer le produit et durant toute activité de nettoyage et de réparation. Bien se laver avec du savon et de l'eau après la manipulation. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

Les personnes qui sont sensibles ou allergiques à l'ail dev raient éviter de manipuler le produit. Les personnes qui sont sensibles ou allergiques à l'ail

devraient éviter les zones traitées jusqu'à ce que le produit sèche ou après une forte pluie.

Appliquer seulement lorsque le potentiel de dérive est minime.

PREMIERS SOINS :

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente**.**

En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prend re note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :
Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE :
Conserver dans le contenant original, à des températures entre 4 °C et 25 °C. Une température d'entreposage plus froide est préférable. Entreposer le contenant à l'endroit et le garde r bien fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Après un entreposage

prolongé, agiter ou brasser vigoureusement pour assurer une suspension uniforme. Le produit devrait être utilisé dans les 12 mois suivant la date de fabrication. Pour éviter la contamination, entreposer ce produit loin de la nourriture humaine ou animale.

ÉLIMINATION/DÉCONTAMINATION :

Ne pas réutiliser le contenant vide. Éliminer le contenant vide dans les ordures ménagères. Le produit qui n'est pas utilisé ou est partiellement utilisé devrait être éliminé dans un lieu d'élimination de déchets dangereux provincial ou municipal.

AVIS À L'UTILISATEUR :

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou des dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.